Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дима

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.08.2004 22:08:26

формирования заключения врача: 24.08.2004 19:45:17

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/47549/answer/47550

Заключение врача

Уважаемый(ая) Дима! 1. Заживление послеоперационной раны - индивидуальный процесс и зависит, прежде всего от осложнений (нагноение, расхождение краев кожи после снятия швов и т.д.). Кожные швы в хирургии принято снимать на 7 - 9 сутки. Рана должна к этому вренмени полностью зажить. Если этого не происходит, далее выполняются перевязки и рана заживает вторичным натяжением в более долгие сроки. Я не знаю, как выглядит Ваша рана, поэтому не могу ничего пояснить более по этому вопросу. Вам, по всей видимости, необходимо выполнять дальнейшие перевязки под руководством уролога или хирурга в поликлинике по месту жительства. В любом случае Вы должны показать рану хирургу, выполнившему операцию. 2. Варикоцелле действительно может вызывать бесплодие, но Вы должны были до операции сдать анализ спермы для оценки её исходного состояния и определения показаний к операции. После оперативного лечения через три месяца сдается контрольная спермограмма и сравнивается с предыдущей для оценки результата операции., т.к. изменения в сперме могут быть вызваны не только варикоцелле. В любом случае (выполняли ли Вы его до операции или нет) сделайте этот анализ в указанный срок и проконсультируйтесь с Вашим врачом. Результат этого анализа ответит на Ваш вопрос. 3. Если Вы чувствуете себя способным - занимайтесь. 4. А почему Вы сейчас ненормально ходите? 5. Сроков ограничения половых контактов нет. Если Вы чувствуете, что можете - пробуйте. Но если есть местная болезненность в мошонке - лучше воздержаться до полного заживления раны. Это правильно и с медицинской точки зрения и с эстетической.