

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ксения

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 07.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 07.10.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/480/answer/481>



## Заключение врача

Уважаемая Ксения! Нефроптоз III степени, протекающий с нарушением оттока мочи, с часто рецидивирующими пиелонефритами (У Вас длительно существующая температура может быть объяснена хроническим пиелонефритом), с артериальной гипертонией (возможно, что у Вас она присутствует - надо контролировать артериальное давление) лечится только оперативно. Операция называется нефропексией - подшивание почки. Ваши врачи правы - чем раньше Вы выполните эту операцию, тем раньше вернётесь к своей прежней жизни. Вы молоды, легко перенесете оперативное вмешательство. Дело в том, что при будущей беременности, если не сделать нефропексию, возможно возникновение различных осложнений со стороны мочевыводящей системы. Поэтому настоятельно рекомендую прислушаться к мнению лечащих врачей. Удачи Вам!