

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.08.2006 20:48:15

формирования заключения врача: 18.08.2006 15:15:19

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/54193/answer/54194



Заключение врача

Если вопрос касается физиологии - то да, каждый половой акт в норме заканчивается семяизвержением. Если Вы спрашиваете, можно ли прерывать половой акт - можно. Однако не рекомендуется. Комплексовать по поводу длительного полового акта не следует. Это состояние возможно при условии нарушенной целостности нервной дуги. Необходимо пройти нейрофизиологическое обследование - оценить бульбокавернозный рефлекс, соматосенсорные вызванные потенциалы. Но может быть и физиологически нормой для Вас. Насчет варикоцеле: Эта патология может привести к бесплодию. Но не каждое варикоцеле необходимо оперировать. Показаниями к операции при варикоцеле являются: патологические изменения спермы по результатам спермограммы, болевой синдром, косметический результат (ничего не беспокоит, анализы в норме, но выраженное расширение и деформация мошонки). Необходимо выполнить спермограмму и УЗИ-допплер исследование органов мошонки и почечных сосудов, после чего уролог определит показания к операции