

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Татьяна

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 29.09.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 29.09.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/5528/answer/5529>



## Заключение врача

Здравствуйтесь, Таня! Ципролета будет достаточно, больше не надо никаких антибиотиков. Глубина введения катетера обусловлена длиной уретры (мочеиспускательного канала), у женщин он составляет 3-4-см, поэтому катетер вводится на эту длину, плюс 2-3 см, обычно это чувствуется. При правильном введении по катетеру сразу выделяется моча. Почему бы не попросить врача уролога хотя бы показать медсестре, как правильно проводить инстилляцию? Мы все когда-то учились, всем нам когда-то показывали те или иные манипуляции. Я не сторонник проведения любых манипуляций на дому, может Вам будет проще найти опытную медсестру? Рад, если действительно Вам хоть чем-то помог. Пишите! [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)