

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** анастасия

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 14.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 14.10.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/556/answer/557>



## Заключение врача

Уважаемая Анастасия! Во время беременности на организм женщины возлагаются дополнительные нагрузки. Это связано с внутриутробным развитием ребенка, с усилением обменных процессов в организме матери. К моменту беременности почки должны быть в максимально здоровом состоянии, т.к. при беременности существует ряд физиологических изменений, которые не самым лучшим образом влияют на организмы матери и ребенка. Дело в том, что гормоны, продуцируемые в период беременности, вызывают расширение и снижение тонуса (атонию) мочеточников; позже беременная матка растет, отклоняется немного вправо, сдавливая правый мочеточник. Все это ведет к нарушению оттока мочи, активизации патогенной флоры, и, соответственно, к обострению пиелонефрита, повышению уровня артериальной гипертензии, что имеет самые неблагоприятные последствия для матери и ребенка. Причем, во время беременности справиться с пиелонефритом гораздо труднее из-за того, что нельзя применять многие высокоэффективные препараты (риск развития патологии плода). Подытоживая все вышесказанное, Анастасия, я рекомендую Вам перед наступлением беременности самым тщательным образом проверить состояние мочевыделительной системы. Под контролем Вашего лечащего уролога надо пройти ряд дополнительных обследований. Если нет снижения функции почек, то наступление беременности не противопоказано. Но весь период беременности и раннего послеродового периода надо регулярно наблюдаться у уролога, для своевременного выявления патологии. Всего хорошего!