

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Георгий

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.10.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 04.10.2004 19:11:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/5578/answer/5579>



Заключение врача

Уважаемый Георгий! Вам надо обратиться к урологу по месту жительства для непосредственного осмотра. Вены, которые вы сами пропальпировали около левого яичка, могут быть проявлением варикоцеле. Варикоцеле - варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 16-18 возраст. Варикоцеле - результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии, т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Так что не затягивайте лечение варикоцеле, обратитесь к урологу для обследования и оперативного лечения. Удачи!

[Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)