

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.10.2004 08:46:57

формирования заключения врача: 07.10.2004 22:03:19

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/5656/answer/5657>



Заключение врача

Уважаемый Александр! Вам надо обратиться к урологу по месту жительства для непосредственного осмотра, т. к. в Вашем вопросе есть неточности: варикоцеле не может быть в области паха. Варикоцеле – варикозное расширение вен семенного канатика (в мошонке), развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 15-18 возраст. Варикоцеле – результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной венозной системы в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертонии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии, т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Никаких медикаментозных методов лечения варикоцеле не существует. Методов оперативного лечения очень много, начиная от открытых оперативных вмешательств, заканчивая лапароскопическими методиками. Какой именно метод выбрать – решает лечащий врач после тщательного обследования. Пишите, если будут еще вопросы.