

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Виктор

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 10.10.2004 16:17:19

**формирования заключения врача:** 10.10.2004 21:19:20

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/5706/answer/5707>



## Заключение врача

Уважаемый Виктор! В Вашем случае виртуально лечение проводить нельзя, необходимо уточнить причину такого рода ощущений. Рези в мочеиспускательном канале могут быть вызваны кандидозом (в народе - молочница) после антибактериального лечения, выделением с мочой солей. Ухудшение струи мочи, учащенное мочеиспускание говорят в пользу воспалительного процесса в предстательной железе. Сдайте анализ на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреоплазмы, кандиды, гарднерелы), сделайте УЗИ (мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы), посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Пишите после получения результатов.