

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.10.2004 13:10:11

формирования заключения врача: 16.10.2004 21:05:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/5816/answer/5817>



Заключение врача

Уважаемый Евгений! Если по результатам УЗИ- исследования нет воспалительного процесса в предстательной железе или ее гипертрофии, если нормальный уровень PSA (простатспецифический антиген - онкомаркер на опухолевые заболевания простаты), то можно говорить о гипотонии мочевого пузыря. Учитывая, что у Вас установлен уретральный катетер, необходимо принимать уросептики (фторхинолоны) небольшими дозами, длительно. Для восстановления тонуса мочевого пузыря действительно можно применять электростимуляцию. Можно также делать электрофорез с прозерин. Внутримышечно прозерин по 1 мл 1 раз в день - 20 дней, потом перерыв. Его сочетают с приемом альфа-блокаторов (кардура, омник, тонокардин и т. д. по 2 мг на ночь). Пишите, если будут еще вопросы. С удовольствием Вам помогу, чем смогу.