

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирна Васильевна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.10.2004 13:49:59

формирования заключения врача: 27.10.2004 20:27:18

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/5992/answer/5993>



Заключение врача

Уважаемая Ирина Васильевна! Варикоцеле - варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст. Варикоцеле - результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии (в чем Ваш врач совершенно прав), т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Осложнения после операции встречаются достаточно редко, в умелых руках операция имеет хорошие результаты. Так что не затягивайте лечение варикоцеле, обратитесь к урологу для обследования и оперативного лечения.