

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Валерия

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 17.10.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/606/answer/607>



## Заключение врача

Уважаемая Валерия! Скорее всего, речь идет о парапелвикальной кисте (это вблизи лоханки почки). В норме почка имеет в длиннике около 10 см. По Вашему описанию киста занимает полпочки, т.е. около 5 см. Такие кисты требуют оперативного вмешательства, ибо сдавливают и нарушают функцию почки. Существуют как открытые методы операций с разрезом кожи, так и малоинвазивные (пункция тонкой иглой под контролем УЗИ). Но прежде, чем выбрать операцию, надо точно определиться с диагнозом. Для этого необходимо выполнить дополнительные обследования - общие анализы крови, мочи, сдать кровь на мочевины, креатинин, остаточный азот, выполнить экскреторную урографию (обязательное обследование). Если диагноз останется под сомнением, то надо выполнить компьютерную томографию. В любом случае назначать такие исследования, выполнять их, ставить показания к тому или иному методу лечения должен Ваш лечащий уролог - плотно контактируйте именно с ним. Если диагноз точно будет подтвержден и это окажется простая киста почки и если функция почки сохранена хоть частично, то удалять ее не целесообразно. Удачи Вам, Валерия!