

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.10.2004 19:58:41

формирования заключения врача: 01.11.2004 15:40:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6086/answer/6087>



Заключение врача

Уважаемая Татьяна! Дисплазия переходного эпителия (или, по-другому, уротелия – клетки, выстилающие внутреннюю поверхность мочевого пузыря) может говорить об опухолевом процессе. Возможно, что потребуются трансуретральное удаление этих папиллом. Дизурические явления могут быть вызваны этими папилломами, в связи с их локализацией вблизи шейки мочевого пузыря. Далее, инстилляции не делаются металлическими катетерами, т. к. это довольно травматично. Принимать те уросептики, которые Вам рекомендовали необходимо для профилактики воспалительного процесса (Вы длительное время употребляете преднизолон, который обладает иммуносупрессорным действием). Для предотвращения дисбактериоза принимайте бификол, линекс, биопродукты. В настоящее время Вам обязательно надо проконсультироваться у онкоуролога. Возможно, что потребуются трансуретральное удаление этих папиллом. Пишите, если будут еще вопросы, буду рад Вам помочь.