

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ирина 28 лет

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 20.10.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/626/answer/627>



## Заключение врача

Уважаемая Ирина! Очень приятно, что Вы прислушались к моим рекомендациям. Моя схема лечения урогенитальной инфекции несколько отличается от схемы, выбранной Вашим врачом. Действительно, при таком типе инфекции (уреаплазмы и хламидии) непременно требуется проведение повторного курса. Для него также применяются антибиотики (отличные от тех, которые Вы принимали при первоначальном курсе), иммуностимулирующие препараты, общеукрепляющие, биопрепараты (бификол, бифидумбактерин - для профилактики дисбактериоза). Через 1 месяц после окончания лечения необходимо сдать контрольные анализы, но уже прицельно только на уреаплазмы и хламидии. Новых средств, сокращающих сроки лечения, применять не следует, т.к. при этой инфекции надо не сокращать сроки лечения, а искоренять причину заболевания, т.е. инфекцию. Дело в том, что уреаплазмы и хламидии очень сильно отражаются на репродуктивной функции женщин (способность воспроизводить потомство), до 40 % женского бесплодия вызывается именно урогенитальной инфекцией. Так что рекомендую прислушаться к назначениям Вашего врача и вылечиться от этого заболевания. Удачи Вам!