

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** сергей

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.11.2004 15:26:05

**формирования заключения врача:** 16.11.2004 18:53:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6304/answer/6305>



## Заключение врача

Уважаемый Сергей! В некоторых случаях бывает, что соскоб из уретры не показывает присутствия инфекции в организме, для этого берут другой материал (кровь). В таких случаях необходимо сделать провокацию за сутки до обследования внутримышечно вводится 0,5 мл гоновакцины. За два часа до обследования не рекомендуется мочиться и проводить гигиенических процедур. К урогенитальным относятся следующие инфекции: хламидии, микоплазмы (2 вида), уреаплазмы (2 вида), гарднереллы, кандиды, трихомонады, гонококки, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека, и другие. Они могут длительное время бессимптомно сохраняться в организме, случайно обнаруживаясь при обследованиях. Удачи!