

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анастасия

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.11.2004 12:31:16

формирования заключения врача: 24.11.2004 21:00:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6430/answer/6431>



Заключение врача

Уважаемая Анастасия! Варикоцеле - варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 15-18 возраст. Варикоцеле - результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Лечение варикоцеле только оперативное, причем на возможно более ранней стадии, т. е. пока не наступили нарушения сперматогенеза. Киста (вероятнее всего придатка яичка или семенного канатика) также может потребовать оперативной коррекции. Технически можно выполнить сразу и операцию по поводу варикоцеле, и операцию по удалению кисты. Но это решает только Ваш лечащий врач, за ним остается последнее слово. Удачи!