

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** стас

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 24.11.2004 14:00:48

**формирования заключения врача:** 24.11.2004 21:03:37

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6454/answer/6455>



## Заключение врача

Уважаемый Стас! Натуживание при мочеиспускании встречается при воспалительном процессе в предстательной железе, опухолях простаты, стриктурах уретры, аномалиях развития уретры, т. е. при многих заболеваниях мочевыводящей системы. Такое состояние требует дообследования. Для этого Вам необходимо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки). Возможно, что надо будет сделать уретроцистоскопию (визуальный осмотр внутренней поверхности уретры и мочевого пузыря). После этого обратитесь к урологу по месту жительства. Удачи!