

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: стас

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.11.2004 14:00:48

формирования заключения врача: 24.11.2004 21:03:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6454/answer/6455>



Заключение врача

Уважаемый Стас! Натуживание при мочеиспускании встречается при воспалительном процессе в предстательной железе, опухолях простаты, стриктурах уретры, аномалиях развития уретры, т. е. при многих заболеваниях мочевыводящей системы. Такое состояние требует дообследования. Для этого Вам необходимо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки). Возможно, что надо будет сделать уретроцистоскопию (визуальный осмотр внутренней поверхности уретры и мочевого пузыря). После этого обратитесь к урологу по месту жительства. Удачи!