

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юрий Васильевич Ткаченко

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.11.2004 16:21:41

формирования заключения врача: 28.11.2004 22:23:36

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6506/answer/6507>



Заключение врача

Уважаемый Юрий Васильевич! Удаление уретрального катетера после аденомэктомии зависит от того, каким методом была проведена операция. Если в ходе операции мочевого пузыря ушивается наглухо, то уретральный катетер обычно мы удаляем на 6-7 сутки. Если операция заканчивается установлением эпицистостомы, то сначала мы удаляем ее (на 2-3 сутки), а потом, по мере закрытия надлобкового свища, удаляем уретральный катетер. Это происходит приблизительно также на 6-7-8 сутки. Если у пациента уретральный катетер вызывает выраженные боли, постоянные позывы на мочеиспускание, чувство сильного дискомфорта, то тогда уретральный катетер мы убираем и ведем такого пациента на эпицистостоме. Если после удаления эпицистостомы свищ долго не закрывается, можно вновь попробовать установить уретральный катетер. Пишите, если будут еще вопросы. С уважением.