

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Надежда

Возраст: 65

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.11.2008 05:09:12

формирования заключения врача: 21.11.2008 10:00:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/65457/answer/65458>



Заключение врача

Уважаемая Надежда! Не бывает 100% методов лечения. Но операция TVT (субуретральный слинг) на сегодняшний день является одним из лучших зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи. Это операция, смысл которой заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Разновидностями TVT являются TOT, IVS и др. Такие операции выполняются практически в амбулаторных условиях (в разных клиниках по-разному)или с 2-3-дневной госпитализацией. Лучшие специалисты по проблеме недержания мочи работают в (Москва). Обратитесь к научному сотруднику, заведующему операционным отделением Алтунину Денису Валерьевичу. Его контактные данные: моб. 8(905)74-32-833. Удачи!