

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Надежда

**Возраст:** 65

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.11.2008 05:09:12

**формирования заключения врача:** 21.11.2008 10:00:55

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/65457/answer/65458>



## Заключение врача

Уважаемая Надежда! Не бывает 100% методов лечения. Но операция TVT (субуретральный слинг) на сегодняшний день является одним из лучших зарекомендовавшим себя способом оперативного лечения недержания мочи. Это операция, смысл которой заключается в подвешивании уретры в виде гамака специальными синтетическими полосками (пропилен). Разновидностями TVT являются TOT, IVS и др. Такие операции выполняются практически в амбулаторных условиях (в разных клиниках по-разному) или с 2-3-дневной госпитализацией. Лучшие специалисты по проблеме недержания мочи работают в (Москва). Обратитесь к научному сотруднику, заведующему операционным отделением Алтунину Денису Валерьевичу. Его контактные данные: моб. 8(905)74-32-833. Удачи!