

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ирина

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.12.2004 11:11:25

формирования заключения врача: 04.12.2004 20:50:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6556/answer/6557>



Заключение врача

Уважаемая Ирина! Причина образования свищей после иссечения парауретральных кист может быть как ятрогенной (в результате врачебных манипуляций), так и неятрогенной. Есть многие технические моменты во время операций, которые помогают избежать подобных осложнений. Это – применение хорошего шовного материала, профилактика хирургической инфекции и гнойных осложнений, дренирование мочевого пузыря в послеоперационном периоде (установка уретрального катетера для избежания попадания мочи в рану). Любой оперирующий хирург знает, что отек и гематома в области после операционной раны (в области иссечения кисты) могут привести к нарушению питания окружающих тканей, нагноению, расхождению краев раны и в итоге к образованию свища. Если возникает уретрит, то необходимо удалить уретральный катетер и промывать уретру растворами антисептиков. Есть большое количество технических особенностей, которые невозможно перечислить. Необходимо учитывать анатомические особенности пациентки, т. к. расположение наружного отверстия мочеиспускательного канала, особенности расположения кисты, строение наружных половых органов – это все очень индивидуально. Но, повторю, что в умелых руках уролога все выше перечисленные осложнения встречаются крайне редко. Пишите, если ответил не на все вопросы.