

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 87

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.11.2008 13:52:00

формирования заключения врача: 23.11.2008 17:37:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/65786/answer/65787>



Заключение врача

Уважаемый Владимир!

1. Учитывая симптомы учащенного мочеиспускания в ночное время, слабую струю мочи, можно предположить существование в Вашем случае аденомы простаты - ДГПЖ. В этой ситуации назначение тамсулозина вполне оправдано. Однако, для исключения злокачественных процессов в простате (что часто наблюдается в возрасте старше 60 лет) Вам необходимо выполнить ТРУЗИ простаты и сдать кровь на ПСА (онкомаркер).

2. Если Вы принимаете тамсулозин или другие альфа-блокаторы, то необходимо знать, что препараты этой группы вызывают ретроградную эякуляцию - состояние, когда сперма при оргазме не выбрасывается наружу, как в норме, в забрасывается в мочевой пузырь. Потом она выделяется с мочой во время мочеиспускания. Это состояние совершенно не опасно для здоровья и может приносить только психологический дискомфорт.

3. Нарушения эрекции носят, вероятнее всего, сосудистый характер. Стимуляция эрекции возможна, но только после предварительной очной консультации уролога и кардиолога.

С уважением.