

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ярослав

**Возраст:** 47

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 03.12.2008 15:40:00

**формирования заключения врача:** 03.12.2008 17:01:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/66927/answer/66928>



## Заключение врача

Уважаемый Ярослав! Уреаплазмы лечатся антибиотиками, лечение назначается обоим партнерам одновременно, во время лечения не рекомендуется жить половой жизнью, после лечения надо сдать контрольный анализ. Есть достаточно эффективные препараты, которые назначаются на очном приеме уролога. Заочно лечение не назначается.

Уреаплазма передается половым путем и является возбудителем воспалительных заболеваний мочеполовых органов и у женщин, и у мужчин. У женщин при воспалительных заболеваниях гениталий уреаплазмы часто обнаруживаются во влагалище и шейке матки, может служить причиной бесплодия (это достоверно доказано) и выкидышей (обнаружили уреаплазмы в амниотической жидкости). У женщин развивается бесплодие вследствие выраженных склеротических изменений фаллопиевых труб вплоть до их обтурации, деструкции эпителия, нарушение внутриорганный кровообращения. Удачи.