

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 09.12.2004 23:30:06

**формирования заключения врача:** 11.12.2004 19:48:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6700/answer/6701>



## Заключение врача

Уважаемый Сергей! В возникновении болезни Пейрони многие пациенты отмечают травму полового члена в прошлом. В Вашем случае необходим непосредственный осмотр и УЗИ полового члена, доплерография (для уточнения причины нарушений эрекции). Допплерографию желательно проводить с фармагрузкой – сначала выполняется на половом члене, находящемся в расслабленном состоянии, затем – на фоне фармагрузки. При таком методе исследования оценивается сразу несколько параметров: скорость и характер кровотока по пенильным артериям, характер изменения этих показателей после фармагрузки. Благодаря этому можно провести диагностику не только самой эректильной дисфункции, но и диагностику различных нарушений в сосудистой патологии полового члена (в том числе и патологического венозного дренажа, тип венозной утечки). По проблеме обследования и лечения (в том числе оперативного) я могу рекомендовать Вам проконсультироваться по этому вопросу в Москве (ул. ), либо обратиться в город Ростов-на-Дону в Ростовский Государственный Медицинский университет на кафедру урологии, зав. кафедрой урологии профессор Коган Михаил Иосифович (пер. Нахичеванский 29, РостГМУ, e-mail (Коган Михаил Иосифович): dept\_kogan@mail.ru, e-mail (Белоусов Игорь Иванович): belrost\_dept@mail.ru). Эта кафедра и её клиники серьезно занимаются проблемой эректильной дисфункции. Можете при обращении сослаться на информацию с нашего сайта UroWeb.ru. Удачи Вам!