

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 38

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.12.2008 18:11:24

формирования заключения врача: 10.12.2008 16:42:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/67783/answer/67784>



Заключение врача

Уважаемый Елена! Для ответа на Ваш вопрос необходимо знать результаты обследований: УЗИ почек и мочевого пузыря, общего анализа мочи, крови, посева мочи на флору, экскреторной урографии. Пузырно-Мочеточниковый Рефлюкс - это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может приводит к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая, иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях рефлюкс (1 степень) самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая (2-3), и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. Удачи!