

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Олег

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.12.2004 14:34:39

**формирования заключения врача:** 23.12.2004 19:06:41

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6864/answer/6865>



## Заключение врача

Уважаемый Олег! Наличие кишечной палочки, даже в невысоком титре, говорит об инфицированности мочеполовых путей. Особую настороженность вызывает наличие инфекции у беременных. Даже если у Вашей жены нет никаких симптомов, лечение проводить надо обязательно, т. к. при беременности существует целый ряд анатомических и физиологических изменений, которые повышают риск развития пиелонефрита, а это в свою очередь может привести к прерыванию беременности и другим нежелательным последствиям. Выбор препарата для лечения, думаю, надо оставить за врачом. Для того, чтобы поспорить о целесообразности назначения того или иного препарата, надо иметь хотя бы базовое медицинское образование. Цефазолин вполне может быть применим при любом сроке беременности. Удачи!