

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олег

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.12.2004 14:34:39

формирования заключения врача: 23.12.2004 19:06:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/6864/answer/6865>



Заключение врача

Уважаемый Олег! Наличие кишечной палочки, даже в невысоком титре, говорит об инфицированности мочеполовых путей. Особую настороженность вызывает наличие инфекции у беременных. Даже если у Вашей жены нет никаких симптомов, лечение проводить надо обязательно, т. к. при беременности существует целый ряд анатомических и физиологических изменений, которые повышают риск развития пиелонефрита, а это в свою очередь может привести к прерыванию беременности и другим нежелательным последствиям. Выбор препарата для лечения, думаю, надо оставить за врачом. Для того, чтобы поспорить о целесообразности назначения того или иного препарата, надо иметь хотя бы базовое медицинское образование. Цефазолин вполне может быть применим при любом сроке беременности. Удачи!