

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Тая

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.12.2004 14:41:03

**формирования заключения врача:** 23.12.2004 20:20:48

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6882/answer/6883>



## Заключение врача

Уважаемая Тая! Дистопия почки – это аномалия расположения почки, т. е. почка располагается в аномальном месте. Дистопия бывает: тазовая, подвздошная, поясничная, внутригрудная. В дистопированной почке значительно чаще наблюдаются патологические процессы. На первом месте стоит пиелонефрит (воспаление почечной лоханки), затем мочекаменная болезнь, гидронефроз. Дистопированная почка, даже без заболевания, может быть причиной болей в поясничной области, животе. У Вашей девочки в моче повышенное количество лейкоцитов, это говорит о наличии активного воспалительного процесса в мочевыводящих путях. Вам необходимо обратиться к детскому урологу для дообследования, наблюдения и лечения. Пишите, если будут еще вопросы.