

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Ольга

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.12.2004 14:08:38

**формирования заключения врача:** 23.12.2004 20:21:47

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6892/answer/6893>



## Заключение врача

Уважаемая Ольга! Пиелозктазия - это небольшое расширение лоханки почки. Пиелозктазия может развиваться в результате воспалительного процесса (например при пиелонефрите), в результате нарушения оттока мочи (при нефроптозе). Лечение зависит от причины развития пиелозктазии (лечение воспалительного процесса). Трудно сказать, чем вызвана такая большая разница в размерах почек. Возможно, что это какие-то погрешности исследования. Обычно я рекомендую своим пациентам делать (конечно, по возможности) УЗИ в одном и том же месте (на одном и том аппарате, у одного и того же специалиста). Этим погрешности сводятся к минимуму. Пишите, если будут еще вопросы, буду рад Вам ответить.