

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юлия

**Возраст:** 38

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 21.12.2008 15:05:00

**формирования заключения врача:** 21.12.2008 15:40:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/69105/answer/69106>



## Заключение врача

Уважаемая Юлия! 1. Нефроптоз такой степени при отсутствии гидронефроза (расширения лоханки почек) не может быть причиной болей в поясничной области. По результатам УЗИ в почках нет ничего страшного. 2. Но, учитывая высокую концентрацию кишечной палочки в моче, Вам совершенно правильно назначили лечение в виде антибактериальной терапии. Нистатин Вам назначен не для лечения ЗППП, а как профилактика дисбактериоза. Его можно заменить на любой другой противогрибковый препарат. 3. Плоду больше навредит инфекция мочевыводящих путей (кишечная палочка), чем назначенные Вам препараты. 4. Ваша дальнейшая тактика - ОАМ, ОАК 1 раз в месяц, посев мочи на флору через 3 недели после последнего приема антибиотиков, УЗИ-контроль почек в 30 и 36-37 недель. Необходима консультация уролога и его наблюдение в течение всей беременности. Удачи.