

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 35

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.12.2008 16:12:00

**формирования заключения врача:** 23.12.2008 17:30:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/69345/answer/69346>



## Заключение врача

Уважаемый Андрей! Однозначно на Ваш вопрос ответить нельзя. Чтобы решить - имеет смысл продолжить оперативное лечение или нет, и вообще, возможно ли оно, необходим осмотр и изучение выписок по предыдущим операциям. Без оперативного лечения проблемы могут быть не только психологического плана. 2 см - это достаточно много, плюс искривление. Не считая проблем с мочеиспусканием, может иметь место проблема с репродуктивной функцией. Может возникнуть ситуация, когда из-за гипоспадии эякулят при эякуляции не достигнет шейки матки. В таком случае для зачатия может потребоваться применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ и т.д.). Вы можете приехать на консультацию (а если надо, то и на лечение) в (Москва). Если Вы живете далеко, но на территории России, то можете воспользоваться квотной помощью <http://03uro.ru/uropedia/quota>. Для решения всех организационных вопросов можете созвониться со специалистами урологами НИИ по телефону 8(905)74-32-833. Удачи.