

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.12.2008 11:19:20

формирования заключения врача: 24.12.2008 12:38:14

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/69374/answer/69375>



Заключение врача

Уважаемый Евгений! **Разрыв уздечки полового члена** бывает при **короткой уздечки полового члена**.

- Если произошел **разрыв короткой уздечки полового члена**, нет кровотечения и дефект не большой, то нужно прекратить половой акт, обработать рану асептическим раствором и дождаться ее заживлени.
- Если **разрыв уздечки полового члана** значительный или сопровождается кровотечением, то необходимо срочно обратиться к дежурному урологу или хирургу. Иногда, в такой ситуации, требуется **ушивание разрыва уздечки полового члена**.
- Если после заживления **разрыва уздечки полового члена** при возобновлении половой жизни вновь возникает **разрыв уздечки**, то необходимо обратиться к урологу для решения вопроса о проведении операции — [пластики уздечки полового члена](#).

По вопросам урологического обследования и лечения в Москве и в Московской области можете обратиться на консультацию к урологу по телефону горячей линии уролога — 8(905)74-32-833. Удачи!