

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владимир

**Возраст:** 19

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.12.2004 13:02:27

**формирования заключения врача:** 29.12.2004 23:06:49

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/6964/answer/6965>



## Заключение врача

Уважаемый Владимир! Все перечисленные инфекции относятся к урогенитальной (т. е. инфекции мочеполового тракта), которая передается половым путем. Не в моих правилах комментировать лечение, назначенное другим врачом, т. е. это просто неколлегиально и неэтично. Но в Вашем случае хочу развеять Ваши сомнения по поводу назначенного лечения. Применение нескольких антибиотиков обусловлено тем, что надо избавиться от 2-х видов инфекции. В лечение также входят иммуностимулирующие препараты, противовоспалительные, противогрибковые препараты (чтобы не было побочного действия антибиотиков - дисбактериоза), физиопроцедуры (для уменьшения явлений воспаления, отека предстательной железы, улучшения кровообращения в простате). При обнаружении урогенитальной инфекции у одного из партнеров, лечение проводят обоим одновременно, рекомендуя во время лечения и до получения отрицательного контрольного анализа не жить половой жизнью. Контроль сдается спустя месяц после последнего приема антибиотиков. Доверьтесь своему врачу, тем более, что все назначения грамотные и профессиональные. Удачи!