

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 27.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/696/answer/697



Заключение врача

Уважаемый Сергей! Если Вы имеете ввиду лапароскопические методы (малыми разрезами), то они по сравнению с обычным открытым методом по Иваниссевичу в достижении косметического эффекта не сильно выигрывают. Например, при лапароскопическом методе делается 3-4 разреза по 1-1,5 см в околопупочной области, длительность операции около 40 мин, вид обезболивания - эндотрахеальный наркоз с проведением ИВЛ (в трахею вставляется интубационная трубка, проводится искусственная вентиляция легких), пребывание в стационаре 3-4 дня. При открытом методе длительность операции 15-20 мин, разрез производится параллельно естественным складкам длиной 3 см, впоследствии не виден (закрыт нижним бельем), наркоз внутривенный на самостоятельном дыхании, в этот или на следующий день пациент уходит домой. Если Вы имеете ввиду микрохирургическую операцию по Лопаткину с применением микрохирургической техники, то это операция производится ангиохирургами, урологами. Это операция заключается в отсечении яичковой вены и подшивании её к внутренней подвздошной вене - для улучшения кровооттока. Это также очень кропотливая операция, требует тщательного специализированного ангиохирургического обследования, наличия микрохирургической техники и, увы, не отличается большим косметическим эффектом, т.к. производится большой разрез передней брюшной стенки. Я Вам, как оперирующий хирург, рекомендую, прежде всего, довериться врачу урологу. Он посоветует такой метод, который нужен именно в Вашем случае. Удачи!