

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: лариса

Возраст: 70

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.12.2008 22:06:57

формирования заключения врача: 30.12.2008 11:25:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/69877/answer/69878>



Заключение врача

Уважаемый лариса! Кисты почек больших размеров замещают нормальную ткань почки, что приводит к развитию хронической почечной недостаточности. Часто единственным проявлением этого заболевания является повышение артериального давления, повышение уровня шлаков крови. Наличие кист в почках приводит к нарушению мочеоттока из почек – создаются благоприятные условия для возникновения и развития мочекаменной болезни и воспалительных процессов в почках. Тактику Вы должны определить с лечащим врачом, т. к. это отдельная тема, в которой невозможно предусмотреть все при однократной консультации. Основные направления – профилактика обострений пиелонефрита, своевременная диагностика камнеобразования, литокинетическая терапия (направленная на удаление камней консервативными методами), при необходимости – хирургическое лечение. За кистами, пока они не достигли размеров 50 мм, необходимо наблюдение. В Вашем случае размеры кисты более 50 мм, при этом можно выполнить пункцию под контролем УЗИ. Альтернативой является лапароскопическая операция. Открытые операции в настоящее время, как правило, практически не используются. Разумеется, необходим постоянный контроль общеклинических анализов (кровь, моча, биохимия, посевы мочи на флору и т. д.). Никаких консервативных методов лечения кист почек не существует. Удачи!