

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: аристарх

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.01.2009 17:06:00

формирования заключения врача: 05.01.2009 17:56:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/70698/answer/70699>



Заключение врача

Уважаемый Аристарх! Если в состоянии эрекции половой член у Вас более 9,5 см, то это норма. В состоянии эрекции головка полового члена должна открываться. Если у Вас этого не происходит, то, вероятно, это фимоз - врожденное сужение крайней плоти, препятствующее освобождению головки из препуциального мешка. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество - смегма, продуцируемое железами, расположенными на головке полового члена. Смегма может сгущаться, инкрустироваться солями, а при присоединении инфекции - разлагаться, вызывая воспаление головки полового члена (баланопостит), что в дальнейшем может привести к развитию рака головки полового члена. Учитывая этот факт, Вам нужно обратиться к урологу для решения вопроса о выполнении циркумцизио (операции по иссечению крайней плоти). Удачи.