

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виталий Н.

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 28.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/708/answer/709>



Заключение врача

Уважаемый Виталий! Такое состояние называется фимозом (сужение крайней плоти). Помимо того, что это доставляет массу неудобств в половой жизни, и иногда делает её невозможной, при фимозе часто возникают баланопоститы (воспаление головки полового члена и крайней плоти) вследствие присутствия постоянного очага инфекции. Кроме того, смегма обладает канцерогенными свойствами (способствует возникновению атипичных клеток) и может вызывать рак головки полового члена. Учитывая все вышесказанное, Вам лучше всего сделать операцию иссечения крайней плоти (циркумцизию). Операция не относится к разряду сложных, длится около 10 мин. Делают её в любом урологическом отделении любой муниципальной больницы, а также в частных клиниках. В обычных больницах бесплатно, в частных клиниках - цены разные. Удачи!