

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.01.2009 11:46:16

формирования заключения врача: 14.01.2009 12:04:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/71742/answer/71743>



Заключение врача

Уважаемый Алексей! Действительно на фотографии видно искривление полового члена. Тактика при таком искривлении полового члена следующая.

1. Необходимо обратиться на прием к урологу или андрологу, который занимается проблемой искривления полового члена.
2. Необходима пальпация полового члена для исключения или подтверждения наличия бляшек или уплотнений в области кавернозных тел полового члена, которые могут говорить о наличии [болезни Пейрони](#).
3. Необходимо выполнить УЗИ полового члена для подтверждения наличия бляшек в области белочной оболочки полового члена, для исключения [болезни Пейрони](#).
4. Обязательно необходимо определиться мешает ли Вам это искривление полового члена жить половой жизнью. Есть ли у Вас недовольство внешним видом искривленного полового члена.
5. Если Вам искривление не мешает, у Вас нет неудовлетворенности, и не выявлено болезни Пейрони, то ничего делать не надо, можно просто наблюдать.
6. Если искривление мешает, то с урологом необходимо решить вопрос о целесообразности оперативного лечения искривления полового члена.
7. Если выявлена [болезни Пейрони](#), то необходимо проводить ее лечение по правилам [лечения болезни Пейрони](#).

Удачи!