

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Макс

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.01.2009 22:31:26

формирования заключения врача: 20.01.2009 11:40:11

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/72509/answer/72510>



Заключение врача

Уважаемый Макс! Варикоцеле – варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст. Варикоцеле – результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Консервативных методов лечения варикоцеле не существует, это заболевание лечится исключительно оперативным способом. Лапароскопическое лечение варикоцеле возможно, в том числе и в муниципальных больницах, где лечение проводится бесплатно. Для этого Вам надо обратиться к урологу поликлиники по месту жительства, который Вам выдаст направление в урологическое отделение больницы. Удачи!