

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Леонид

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 16.01.2005 15:43:22

**формирования заключения врача:** 17.01.2005 20:08:32

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/7274/answer/7275>



## Заключение врача

Уважаемый Леонид! Насчет припухлости трудно сказать виртуально – необходим непосредственный осмотр – это может быть все что угодно (грыжа, или просто кожная складка). Катетер Петцера сделан из резины, он постоянно контактирует с мочой (которая является агрессором), конечно, неприятный запах будет присутствовать, несмотря на хороший уход. Но это запах можно минимизировать (хороший уход, смена катетера по мере необходимости). Кожу вокруг катетера можно обрабатывать 3% перекисью водорода, а потом пастой Лассара (цинково-синтомициновая эмульсия). Спиртовый раствор йода обладает раздражающим действием, тем более на поверхность формирующегося свища. Кратность сдачи анализов необходимо определить с лечащим урологом (у нас все стомированные больные находятся на учете, за ними осуществляется контроль, наблюдение). Для чего был назначен леспеплан? У Вас была почечная недостаточность? В таком случае надо сдать все общеклинические анализы (общий крови, общий мочи, креатинин, мочевины, остаточный азот, общий белок, билирубин и т.д.). После получения результатов определяться с дальнейшей тактикой. Удачи Вам!