

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юрий

**Возраст:** 62

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.01.2009 21:39:24

**формирования заключения врача:** 21.01.2009 16:11:39

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/72806/answer/72807>



## Заключение врача

Уважаемый Юрий! 1. Пересдать повторно ПСА через 2 недели, т. к. у Вас он повышен. Но на фоне урологического осмотра, разных манипуляций, ПСА может повыситься. Если пересданный повторно уровень ПСА окажется выше 4,0 нг/мл, то необходимо выполнить мультифокальную биопсию простаты под УЗИ-контролем для исключения онкологического процесса в простате. 2. Для выяснения причины снижения качества эрекции Вам необходимо пройти тщательное обследование: УЗИ или ТРУЗИ простаты, семенных пузырьков, кавернозометрию, УЗИ-доплер сосудов полового члена, сдать кровь на тестостерон. 3. На эрекцию ни простатит, ни возможный онкопроцесс не влияют. Удачи!