

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Лариса

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.10.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 30.10.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/728/answer/729>



## Заключение врача

Здравствуйте, Лариса! Возможно, что у Вас после перенесенных заболеваний (лапароскопические операции, хронический цистит, хламидиоз, микоплазмоз, эндомериоз, спаечный процесс в малом тазу), развился так называемый гиперактивный мочевой пузырь. Хотелось бы уточнить, сдавали ли Вы общий анализ мочи и контрольные анализы (после лечения) на хламидии и микоплазмы, делали Вам цистоскопию (инструментальный осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря). Если воспалительный процесс действительно отсутствует, то попробуйте принимать препарат дриптан по 1 таб. 2 раза в день. Это антихолинергический препарат, который применяется при различных нарушениях мочеиспускания. Но, хочу напомнить, что виртуальная консультация не заменит непосредственного осмотра уролога. Обязательно после выходных обратитесь к своему лечащему врачу. Проблема у Вас действительно существует, и ею надо тщательно и серьезно заниматься. С уважением.