

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лариса

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.10.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 30.10.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/728/answer/729>



Заключение врача

Здравствуйте, Лариса! Возможно, что у Вас после перенесенных заболеваний (лапароскопические операции, хронический цистит, хламидиоз, микоплазмоз, эндомериоз, спаечный процесс в малом тазу), развился так называемый гиперактивный мочевой пузырь. Хотелось бы уточнить, сдавали ли Вы общий анализ мочи и контрольные анализы (после лечения) на хламидии и микоплазмы, делали Вам цистоскопию (инструментальный осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря). Если воспалительный процесс действительно отсутствует, то попробуйте принимать препарат дриптан по 1 таб. 2 раза в день. Это антихолинергический препарат, который применяется при различных нарушениях мочеиспускания. Но, хочу напомнить, что виртуальная консультация не заменит непосредственного осмотра уролога. Обязательно после выходных обратитесь к своему лечащему врачу. Проблема у Вас действительно существует, и ею надо тщательно и серьезно заниматься. С уважением.