

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лариса

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.01.2005 21:43:33

формирования заключения врача: 22.01.2005 21:13:45

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/7348/answer/7349>



Заключение врача

Уважаемая Лариса! Причин развития гиперактивного пузыря очень много. Гиперактивный мочевой пузырь является клиническим проявлением гиперактивности детрузора, которая заключается в непроизвольном сокращении при наполнении мочевого пузыря. Причины делятся на нейрогенные (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, остеохондроз, ушиб спинного мозга, последствия операций на позвоночнике и многие др.) и идиопатические. К последним относятся анатомические, миогенные, сенсорные (чувствительные) нарушения, инфравезикальная обструкция (нарушения оттока мочи, вызванные непроходимостью мочевых путей ниже мочевого пузыря), возраст. Истинную причину гиперактивности мочевого пузыря иногда установить очень трудно. В таких случаях проводят тест-терапию гиперактивности. Все вопросы необходимо решать индивидуально. Удачи!