

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** марина

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 27.01.2009 10:27:11

**формирования заключения врача:** 28.01.2009 17:40:50

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/74297/answer/74298>



## Заключение врача

Уважаемый марина! 1. Пиелозктазия справа при беременности возникает из-за того, что правая почка наиболее подвержена изменениям при беременности (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки). 3. В Вашей ситуации надо обратиться к урологу, выполнить общий анализ мочи, посев мочи на флору, биохимический анализ крови (креатинин, мочевины). При нарастании гидронефроза - его разрешение (нефростомия, стентирование). 4. Сейчас - позиционная гимнастика (на четвереньках - чтобы матка отклонялась вперед и вниз, освобождая мочеточник и улучшая отток мочи из почки). 5. УЗИ контроль почек в 32 и 36-37 недель, другие обследования - по показаниям. Удачи!