

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Анастасия

**Возраст:** 42

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 28.01.2009 13:38:00

**формирования заключения врача:** 28.01.2009 16:57:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/74375/answer/74376>



## Заключение врача

Уважаемая Анастасия!

1. По УЗИ нефроптоз не ставится, он только предполагается. Основанием для диагноза нефроптоза является экскреторная урография в положениях лежа и стоя.
2. Пиелюктазия справа при беременности возникает из-за того, что правая почка наиболее подвержена изменениям при беременности (анатомическая особенность беременной матки - чаще отклоняется вправо, сдавливая правый мочеточник, плюс гормоны беременной женщины расслабляют мочеточник, нарушая отток мочи из почки).
3. В Вашей ситуации надо обратиться к урологу, выполнить общий анализ мочи, посев мочи на флору, биохимический анализ крови (креатинин, мочевина). При нарастании гидронефроза - его разрешение (нефростомия, стентирование).
4. Сейчас - позиционная гимнастика (на четвереньках - чтобы матка отклонялась вперед и вниз, освобождая мочеточник и улучшая отток мочи из почки).
5. УЗИ контроль почек в 32 и 36-37 недель, другие обследования - по показаниям.

Удачи.