

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: ЮЛИЯ

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.01.2005 04:11:30

формирования заключения врача: 29.01.2005 21:25:19

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/7524/answer/7525>



Заключение врача

Уважаемая Юлия! Прежде всего, необходимо выяснить причину гипоплазии левой почки, выяснить – врожденная гипоплазия или приобретенная. Если врожденная, то Ваш уролог совершенно прав – нет никаких ограничений жизнедеятельности, организм полностью адаптирован к такой работе почки. Если это результат прогрессирующего хронического пиелонефрита (т. е. приобретенная гипоплазия), то тогда нужно лечить хронический пиелонефрит – длительные противорецидивные курсы уросептиков и антибиотиков, согласно посевам мочи на флору и чувствительности к антибиотикам. Также выраженное снижение функции почки может развиваться при нарушении оттока мочи. Для выяснения всех этих обстоятельств нужно сделать экскреторную урографию (рентгенообследование почек). От результатов обследования зависит дальнейшая тактика. Пишите, если будут еще вопросы.