

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.01.2005 18:03:53

формирования заключения врача: 02.02.2005 18:10:33

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/7570/answer/7571>



Заключение врача

Уважаемый Алексей! Микоплазмы и уреаплазмы относятся к урогенитальной инфекции, т. е. инфекции мочеполового тракта. Путь передачи этого вида инфекции - половой, при любых формах половых контактов. Я согласен с Вашим урологом, что урогенитальную инфекцию необходимо лечить. Хотя в настоящее время на Западе (да и у нас) этот вопрос остается дискуссионным. Никто еще не определил ту «малую» концентрацию инфекции, при которой она остается не патогенной и не опасной для организма. Урогенитальная инфекция у мужчин вызывает различные заболевания мочеполового тракта, может быть причиной бесплодия. У женщин - бесплодие, ранние и поздние аборты, самопроизвольные выкидыши, мертворождаемость, рождение ребенка с дефектами развития (явные, скрытые), врожденные уродства и нервно-психические заболевания. Поэтому лечение урогенитальной инфекции назначают обоим партнерам одновременно. Прочитав мой ответ, решайте сами - лечиться или нет. Ваше здоровье - в Ваших руках. Пишите, если что, буду рад Вам помочь.