

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Людмила

Возраст: 44

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.02.2009 12:18:22

формирования заключения врача: 10.02.2009 12:17:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/76654/answer/76655>



Заключение врача

Уважаемая Людмила! ПМР - это состояние, когда моча забрасывается из мочевого пузыря обратно в почку, вызывая расширение чашечно-лоханочной системы. Если есть рефлюкс, то будет существовать и хронический рецидивирующий пиелонефрит (вследствие заброса мочи), который может привести к сморщиванию почки, развитию хронической почечной недостаточности, т. е. постепенному снижению функции почки. Лечение этого вида аномалии зависит от вида рефлюкса, его степени, частоты обострений пиелонефрита, общего состояния ребенка. Если степень рефлюкса небольшая, иногда назначают длительные курсы антибактериальной терапии (в течение нескольких месяцев). В некоторых случаях (1 степень) рефлюкс самостоятельно проходит к 9-10 годам. Если же степень рефлюкса высокая, и существует неблагоприятный общий фон, то тогда предлагается оперативное лечение - антирефлюксная операция. Способ лечения рефлюкса в каждом отдельном случае определяется строго индивидуально. Есть консервативные методы лечения, которые заключаются в отведении мочи и проведении антибактериальной терапии. Также существуют и оперативные методы. Их очень много, решать какой именно надо применить должен только лечащий врач уролог. Выбор методики зависит от оперирующего уролога по результатам обследований - степени рефлюкса, и от того, каким методом лучше владеет хирург, какой метод применяют в данной клинике Удачи!