

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 46

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 19.02.2009 17:41:06

**формирования заключения врача:** 21.02.2009 22:36:25

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/77790/answer/77791>



## Заключение врача

Уважаемая Елена! Часто у женщин после родов возникает слабость мышц тазового дна, и к существующему у большинства женщин циститу присоединяется уже органический компонент - вероятнее всего, цистоцеле (это опущение мочевого пузыря, что еще называется опущением передней стенки влагалища, но в данном случае подчеркивается заинтересованность в процессе мочевыводящей системы. Цистоцеле может сопровождаться стрессовой инконтиненцией (недержанием) мочи, связанным с родовой травмой мышц таза и мочевого пузыря. В такой ситуации какие-либо консервативные методы лечения, как правило, малоэффективны. Но в любом случае, чтобы сказать точно, необходимо выполнить КУДИ - комплексное уродинамическое исследование. Подробнее смотрите на <http://03uro.ru/uropedia/urinary-incontinence-in-women>. Можете обратиться к специалистам урологам проекта UroWeb (Москва) заочно и/или записаться на очный прием по телефону "горячей линии" 8(905)74-32-833 (Москва). Удачи!